

Тесты безопасность
Раздел «ЛОР»

1. Показанием для трахеотомии является:
 - a. Острый ларингит
 - b. Острый фарингит
 - c. Дифтерия
 - d. Хронический атрофический ларингит

2. Положительный симптом «козелка» у ребенка первого года жизни служит признаком:
 - a. Острого среднего отита
 - b. Тубоотита
 - c. Хронического среднего отита
 - d. Мастоидита

3. При введении капель в ухо температура жидкости должна быть:
 - a. 18-20 градусов
 - b. 20-25 градусов
 - c. 30-35 градусов
 - d. 36-37 градусов

4. Ухудшение слуха после купания характерно для:
 - a. Иностранного тела наружного слухового прохода
 - b. Серной пробки в наружном слуховом проходе
 - c. Острого среднего отита
 - d. Ларингита

Раздел «Педиатрия»

5. Основным жаропонижающим препаратом в детской практике, применяющимся для борьбы с гипертермическим синдромом:
 - a. Атропин
 - b. Парацетамол
 - c. Винпоцетин
 - d. Циклодол

6. При оказании неотложной помощи ребенку с гипертермическим синдромом противопоказано:
 - a. Согревание
 - b. Холодное обертывание пеленками, смоченными водой комнатной температуры
 - c. Применение пузыря со льдом на область крупных сосудов
 - d. Раздеть ребенка

7. С целью максимального эффекта при оказании помощи ребенку с анафилактическим шоком лекарственные препараты вводят:
 - a. Энтерально
 - b. Внутримышечно
 - c. Подкожно
 - d. Внутривенно

8. Для купирования судорожного синдрома у детей применяют:
- a. Димедрол
 - b. Парацетамол
 - c. Адреналин
 - d. Реланиум

Раздел «МДК 02.04»

9. Основной механизм заражения при кишечных инфекциях:
- a. Воздушно-капельный
 - b. Фекально-оральный
 - c. Парентеральный
 - d. Трансмиссивный
10. Основные симптомы менингита:
- a. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига
 - b. Парез конечностей
 - c. Везикулярная сыпь
 - d. Геморрагическая сыпь
11. Донор должен обязательно обследоваться на:
- a. Дизентерию
 - b. Сибирскую язву
 - c. Вирусный гепатит «В»
 - d. Эшерихиоз

Раздел «Психиатрия»

12. Госпитализация пациента без согласия возможна если:
- a. Он опасен для себя и окружающих
 - b. Пациент перестал спать
 - c. Настаивают родственники
 - d. Пациент обратился впервые за медицинской помощью
13. Расстройства, характерные только для психоза:
- a. Бред
 - b. Тревога
 - c. Страх
 - d. Эмоциональная лабильность
14. Для алкогольного делирия характерны:
- a. Слуховые галлюцинации
 - b. Обонятельные галлюцинации
 - c. Зрительные зоологические галлюцинации
 - d. Вкусовые галлюцинации
15. Дебют шизофрении наступает:
- a. В грудном возрасте
 - b. После 50 лет
 - c. В 16 - 25 лет
 - d. В старческом возрасте

Раздел «Терапия»

16. Независимое сестринское вмешательство при приступе желчной колики:
- Тепло на область правого подреберья
 - Холод на область проекции желчного пузыря
 - Введение баралгина, но-шпы
 - Введение наркотических анальгетиков.
17. Независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом состоянии:
- Напоить алкоголем
 - Ввести эуфиллин
 - Ввести инсулин
 - Напоить сладким чаем и дать легкоусвояемые углеводы.
18. Кардиогенный шок – это:
- Осложнение язвенной болезни желудка
 - Осложнение массивной кровопотери
 - Осложнение острого инфаркта миокарда
 - Осложнение бронхиальной астмы.
19. Независимое сестринское вмешательство при приступе стенокардии:
- Дать трамадол перорально
 - Дать нитроглицерин под язык
 - Ввести раствор морфина внутривенно
 - Ничего не предпринимать
20. Самым частым осложнением язвенной болезни является:
- Кишечная непроходимость
 - Кахексия
 - Обезвоживание
 - Желудочно-кишечное кровотечение
21. При кетоацидотической коме у пациента медицинская сестра определяет в выдыхаемом воздухе:
- Запах алкоголя
 - Запах аммиака
 - Запах ацетона
 - Отсутствие запаха
22. При остром гломерулонефрите постельный режим назначают:
- До нормализации температуры тела
 - До исчезновения боли в поясничной области
 - До нормализации анализов мочи
 - До исчезновения отеков и нормализации АД
23. Независимое сестринское вмешательство при приступе почечной колики:
- Холод на область поясницы
 - Тепло на область поясницы
 - Введение обезболивающих препаратов
 - Напоить сладким чаем.

Раздел «ПМ.03»

24. Длительность клинической смерти составляет:
- 2 минуты
 - 18 минут
 - 5 минут
 - 30 минут
25. Основным показателем состояния кислотно-щелочного равновесия является:
- Уровень глюкозы крови
 - Уровень систолического АД
 - Уровень рН крови
 - Уровень электролитов крови
26. В норме рН крови составляет:
- 4,5
 - 5,4
 - 4,7
 - 7,4
27. При отсутствии эффекта от приема Геймлиха, на догоспитальном этапе выполняют:
- Трахеотомию
 - Цистотомию
 - Коникотомию
 - Торакотомию
28. При обморожении необходимо наложить:
- Давящую повязку
 - Теплоизолирующую повязку
 - Окклюзионную повязку
 - Повязку Дезо
29. Базовая реанимация у взрослого пациента должна продолжаться:
- 25 минут
 - 5 минут
 - 30 минут
 - 60 минут
30. Соотношение компрессий грудной клетки и вдуваний при проведении базовой реанимации составляет:
- 100 : 2
 - 30 : 2
 - 15 : 2
 - 5 : 4
31. При проведении базовой реанимации в первую очередь надо проводить:
- Открытие дыхательных путей
 - Искусственное дыхание
 - Закрытый массаж сердца
 - Медикаментозную терапию

Раздел «Акушерство»

32. Наиболее тяжелой стадией гестоза является:
- Нефропатия беременных
 - Преэклампсия
 - Эклампсия
 - Отеки беременных
33. Ведущим синдромом при нарушенной трубной беременности является:
- Синдром общей интоксикации
 - Синдром дегидратации
 - Синдром острой кровопотери
 - Судорожный синдром
34. Основным методом остановки дисфункционального маточного кровотечения является:
- Введение кровоостанавливающих препаратов
 - Введение сокращающих препаратов
 - Выскабливание полости матки и цервикального канала
 - Проведение инфузионной терапии
35. Основным методом обследования при фоновых состояниях шейки матки является:
- Мазок на флору
 - Пап-тест
 - Гистероскопия
 - УЗИ органов малого таза

Раздел «Инфекционные болезни»

36. Способность микроорганизмов проникать через кожу и слизистые внутрь органов и тканей – это:
- Патогенность
 - Вирулентность
 - Токсигенность
 - Инвазивность
37. Анафилактический шок развивается после введения сыворотки:
- Немедленно
 - Через 2-3 часа
 - На 2-3 сутки
 - Через 7-12 дней
38. Путь заражения ВИЧ-инфекцией:
- Воздушно-капельный
 - Трансмиссивный
 - Парентеральный
 - Контактно-бытовой

39. Хронический гепатит формируется в 50 % случаев и более у перенесших вирусный гепатит:
- a. В
 - b. D
 - c. А
 - d. Е

Раздел «Дерматовенерология»

40. Гнойничковые заболевания кожи называются:
- a. Микозы
 - b. Пиодермии
 - c. Паразитарные дерматозы
 - d. Кандидозы
41. Заболевания, передающиеся половым путем:
- a. Сифилис, гонорея, трихомониаз
 - b. Гепатит А
 - c. Чесотка
 - d. Псориаз
42. Обязательному ежегодному обследованию на сифилис подлежат:
- a. Преподаватели
 - b. Продавцы продовольственных товаров
 - c. Продавцы бытовой техники
 - d. Водители

Раздел «ПМ.01»

43. Обязательное условие допуска медицинской сестры к исполнению профессиональных обязанностей медицинской сестры терапевтического участка – наличие:
- a. Документа о профессиональной переподготовке
 - b. Сертификата специалиста
 - c. Стажа работы не менее 1 года
 - d. Стажа работы не менее 3 лет
44. Дата наступления родов высчитывается:
- a. По последнему дню предыдущей менструации
 - b. По первому дню последней менструации
 - c. По сроку беременности при первой явке в женскую консультацию
 - d. По результатам пельвиометрии
45. Геронтология изучает:
- a. Процессы умирания
 - b. Закономерности старения
 - c. Физиологию человека
 - d. Вопросы оживления человека

46. Наука о болезнях людей пожилого и старческого возраста носит название:
- Педиатрия
 - Гериатрия
 - Фтизиатрия
 - Эндокринология
47. Намеренное ускорение смерти или умерщвление носит название:
- Экстирпация
 - Эктомия
 - Эвтаназия
 - Эксгумация
48. Здоровые и практически здоровые люди относятся к группе здоровья:
- Второй
 - Третьей
 - Первой
 - Четвертой
49. Установившийся порядок, устройство общественной жизни, быта, культуры определяется как:
- Стиль жизни
 - Уклад жизни
 - Уровень жизни
 - Качество жизни
50. Вакцинация относится к профилактике:
- Первичной
 - Вторичной
 - Третичной
 - Смешанной
51. Ведущая причина смертности в мире и в России:
- Онкологические заболевания
 - Сердечно - сосудистые заболевания
 - Травмы и отравления
 - Сахарный диабет

Раздел «Хирургия»

52. Тактика медицинской сестры при ущемленной грыже:
- Срочная госпитализация
 - Грелка на живот
 - Вправление грыжи
 - Очистительная клизма
53. Сестринское вмешательство при артериальном кровотечении:
- Переливание крови
 - Введение кровезаменителей
 - Тугая тампонада раны
 - Наложение артериального жгута.

54. Реципиенту с группой крови 0(1) rh (-) можно перелить кровь:
- 0(1)Rh(+)
 - 0(1) rh (-)
 - B(III) rh(-)
 - AB(IV) rh(-)
55. Тактика медицинской сестры при фурункуле:
- Вскрыть и дренировать
 - Применить тепловую процедуру
 - Срочно направить к врачу
 - Назначить антибиотик
56. Профилактику столбняка необходимо провести при:
- Ушибе мягких тканей
 - Закрытом переломе плеча
 - Колотой ране стопы
 - Растяжении связок сустава
57. Пациента с массивной кровопотерей транспортируют:
- Полусидя или сидя
 - Лежа на ровно на спине
 - Лежа с приподнятой головой
 - Лежа с приподнятыми ногами

Раздел «МДК 02.02»

58. Что означает понятие «здоровье»?
- Полное физическое, духовное и социальное благополучие
 - Отсутствие хронических заболеваний и функциональных нарушений
 - Отсутствие физических и психических нарушений
 - Отсутствие заболеваний
59. Выносливость организма могут тренировать:
- Бег
 - Дыхательные упражнения
 - Перебрасывание мяча
 - Изометрические упражнения
60. Терренкур - это:
- Лечение дозированным восхождением
 - Ходьба по трафарету
 - Ходьба перед зеркалом
 - Прогулка по ровной поверхности

Раздел «Нервные болезни»

61. Моторная афазия – это:
- Пациент забывает названия слов
 - Пациент понимает, что хочет сказать, но не может произнести
 - Пациент не понимает обращенную к нему речь
 - Пациент не осознает, что хочет сказать
62. При центральном параличе происходит:
- Повышение мышечного тонуса конечностей
 - Понижение мышечного тонуса конечностей
 - Спазм мышц шеи
 - Напряжение мышц головы

Раздел МДК 02.03

63. Ранняя реабилитация инсультов начинается:
- Через месяц после начала заболевания
 - Через 10 дней после начала заболевания
 - Через неделю после начала заболевания
 - Сразу после выхода из комы в ОРИТ
64. При переломе позвоночника с повреждением спинного мозга приоритетной проблемой является:
- Нарушение тазовых функций
 - Нарушение речи
 - Нарушение глотания
 - Нарушение памяти
65. Пациент с гемипарезом нуждается в:
- Массаже области проекции мочевого пузыря
 - Катетеризации мочевого пузыря
 - Прикроватном туалете
 - Постоянном ношении памперсов
66. При застойной пневмонии основным методом реабилитации является:
- Эрготерапия
 - Дыхательная гимнастика
 - Электрофорез
 - Водолечение